Cabinet Dentaire de Peujard

Avenue du Clos Vallon 33240 Peujard
Tel. : +33 5 57 68 74 71
dr-audy-yannick.chirurgiens-dentistes.fr

Les parodontites (déchaussement des dents)

La parodontite est une pathologie à prendre au sérieux puisque, dans les cas les plus sévères, elle peut conduire à une perte des dents.

QU'EST-CE QU'UNE PARODONTITE ?

- À l'origine, la parodontite se caractérise par une inflammation de la gencive et de l'os qui entourent les dents. L'infection entraîne une destruction des tissus parodontaux qui soutiennent la dent (gencive, cément et os de la mâchoire).
- Lorsque la maladie progresse, une poche parodontale se forme entre la gencive et la dent. Elle devient rapidement le réceptacle d'une grande quantité de bactéries et de tartre, ce qui aggrave l'irritation de la gencive et empêche la guérison. À son stade le plus avancé, la parodontite provoque la perte des dents.
- Le tabac ou un diabète non équilibré constitue un facteur aggravant dans l'évolution et le traitement de la maladie.



QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

- Plusieurs signes sont révélateurs d'une éventuelle parodontite, parmi lesquels des gencives rouges et gonflées qui saignent facilement lors du brossage, des mobilités dentaires, une mauvaise haleine, un abcès de la gencive... Des rétractions gingivales, des tassements alimentaires ou encore des dents sensibles au froid sont également des symptômes qui doivent vous mettre sur la piste.
- La parodontite peut aussi avoir des conséquences sur le plan esthétique. La destruction des tissus parodontaux risque d'entraîner de forts désagréments tels que la rétraction de la gencive et l'apparition d'espace entre les dents dits « trous noirs ».



Source : Webdentiste

Attention !

- Les gingivites non soignées sont à l'origine de nombreuses parodontites.
- Une hygiène dentaire rigoureuse, accompagnée de détartrages réguliers, permet le plus souvent d'éviter l'apparition ou l'évolution des parodontites.

À SAVOIR

Pour prévenir le développement d'une parodontite, il faut agir vite. En cas de saignements des gencives, ou si vos dents se mettent à bouger, parlez-en à votre chirurgien-dentiste afin de débuter les soins et les mesures de prévention nécessaires.

Afin d'éviter la formation de tartre sous votre gencive, accompagnez votre brossage des dents d'un léger passage sur les gencives en allant toujours du rouge vers le blanc.

Le déchaussement des dents peut aussi avoir une origine génétique. Si vous pensez avoir des antécédents familiaux, n'hésitez pas à en discuter avec votre chirurgien-dentiste qui préconisera un traitement préventif adapté à votre cas.